

# Giftpflanzen

## Beschauen, nicht kauen<sup>(Fn.1)</sup>

(GUV-SI 8018 [bisher GUV 29.15])

### Inhaltsübersicht

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| -  | <b>Alle Jahre wieder: Vergiftungen durch Pflanzen</b>                 | -- | <b>Garten- und Feuerbohne</b>  |
| -  | <b>Was versteht man unter Giftpflanzen?</b>                           | -- | <b>Tollkirsche</b>   |
| -  | <b>Mit Giftpflanzen leben</b>   | -- | <b>Bittersüßer Nachtschatten</b>   |
| -  | <b>Warum war eine Überarbeitung der vorliegenden Broschüre nötig?</b> | -- | <b>Schwarzer Nachtschatten</b>   |
| -  | <b>Was müssen sie im Vergiftungsfall tun?</b>                         | -- | <b>Kartoffel</b>   |
| -  | <b>Bäume und Sträucher</b>  | -- | <b>Gefleckter Aronstab</b>   |
| -- | <b>Goldregen</b>  | -- | <b>Stechapfel</b>  |
| -- | <b>Eberesche (Vogelbeerbaum)</b>                                      | -- | <b>Schwarzes Bilsenkraut</b>   |
| -- | <b>Mahonie</b>  | -- | <b>Wasserschierling</b>  |
| -- | <b>Zwergmispel</b>  | -- | <b>Gefleckter Schierling</b>   |
| -- | <b>Feuerdorn</b>  | -- | <b>Virginischer Tabak</b>  |
| -- | <b>Eibe</b>   | -- | <b>Roter Fingerhut</b>   |
| -- | <b>Rote und Schwarze Heckenkirsche</b>                                | -- | <b>Blauer und Gelber Eisenhut</b>  |
| -- | <b>Seidelbast</b>   | -- | <b>Herbstzeitlose</b>  |
| -- | <b>Schneebeere (Knallerbse)</b>                                       | -- | <b>Rotbeerige und Schwarzbeerige Zaunrübe</b>  |
| -- | <b>Gemeiner Liguster</b>  | -- | <b>Gelbe und Blaue Lupine</b>  |
| -- | <b>Lorbeerkirsche</b>   | -- | <b>Christrose</b>  |
| -- | <b>Stechpalme</b>   | -- | <b>Riesen-Bärenklau (Herkulesstaude)</b>   |
| -- | <b>Pfaffenhütchen</b>   | -- | <b>Wiesen-Bärenklau</b>  |
| -- | <b>Gemeiner und Wolliger Schneeball</b>                               | -- | <b>Zypressen- und Garten-Wolfsmilch</b>  |
| -- | <b>Roskastanie</b>  | -- | <b>Scharfer Hahnenfuß (Butterblume)</b>  |
| -- | <b>Lebensbaum</b>   | -  | <b>Topfpflanzen</b>  |
| -- | <b>Sadebaum (Sevenstrauch)</b>  | -- | <b>Dieffenbachie</b>   |
| -- | <b>Wunderbaum</b>   | -- | <b>Korallenbäumchen</b>  |
| -- | <b>Oleander</b>   | -- | <b>Weihnachtsstern</b>   |
| -- | <b>Gemeiner Efeu</b>  | -- | <b>Alpenveilchen</b>   |
| -- | <b>Robinie (Falsche Akazie)</b>                                       | -  | <b>Einige ungiftige Ziersträucher</b>  |
| -- | <b>Faulbaum</b>   | -  | <b>Verzeichnis der Giftinformationszentren der Bundesrepublik Deutschland (gemeldet nach § 16 e ChemG; Stand: November 2005)</b> |
| -- | <b>Besenginster</b>   |    |  |
| -  | <b>Krautige Pflanzen</b>  |    |  |
| -- | <b>Maiglöckchen</b>   |    |  |

## Alle Jahre wieder: Vergiftungen durch Pflanzen

*Vom Abdruck des Abschnitts wurde abgesehen.*

1. Der Abdruck des Auszuges aus den GUV-Informationen Giftpflanzen – Beschauen, nicht kauen erfolgte mit freundlicher Genehmigung des Bundesverbandes der Unfallkassen.

### Was versteht man unter Giftpflanzen?

Giftigkeit ist ein relativer Begriff, das wusste schon der mittelalterliche Arzt Paracelsus, von dem der bekannte Satz stammt:

„Allein die Dosis macht ein Gift.“

Diese Aussage erklärt, warum die Übergänge zwischen Heilpflanzen und Giftpflanzen fließend sind und warum der Begriff „Giftpflanzen“ nicht leicht zu umreißen ist. Ob und wie stark eine bestimmte Wirkstoffdosis bei einem Menschen als Gift wirkt, hängt auch von seinem Alter, seiner Konstitution und seinem Gesundheitszustand ab. Außerdem muss man wissen, dass nicht jede Pflanze der gleichen Art den gleichen Wirkstoffgehalt hat. In Abhängigkeit vom Erbgut (Unterarten, Rassen), vom Standort, vom Klima und Wetter, vom Alter und von der Vegetationsperiode der Pflanze unterliegen die Wirkstoffmengen Schwankungen. Auch die verschiedenen Organe einer Pflanze (z. B. Wurzel, Stängel, Blätter, Blüten, Früchte) können verschiedene Wirkstoffe bzw. Wirkstoffmengen enthalten. Zur Gruppe der „Giftpflanzen“ gehören solche Bäume, Sträucher und krautige Pflanzen, deren Inhaltsstoffe bei Menschen und Tieren Gesundheitsstörungen hervorrufen können.

Zur Vergiftung mit sogenannten Giftpflanzen kommt es nur, wenn die kritischen Wirkstoffe in genügend hoher Dosierung im oder am Körper einwirken können. Glücklicherweise verhindert ein spontanes Erbrechen (körpereigener Schutzmechanismus) in vielen Fällen, dass eine solche giftige Wirkstoffkonzentration entsteht.

### Mit Giftpflanzen leben

Vergiftungsfälle durch Pflanzen gehören zu jenen Gesundheitsschädigungen, die sich mit sinnvollen Maßnahmen verhüten lassen. Allerdings gibt es über das, was sinnvoll ist, verschiedene Meinungen.

Die einen halten es für vorrangig, alle Pflanzen, die nur irgendeinen giftigen Inhaltsstoff enthalten, aus dem Umfeld von Kindern (Spielplätze, Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Sportplätze) auszuschließen.

Die anderen – meist Naturfreunde und Befürworter von Pflanzenvielfalt – plädieren aus ökologischen wie pädagogischen Gründen für eine Erziehung zur Vorsicht. Kleine Kinder sollen lernen, dass unbekannte Früchte oder andere Pflanzenteile nicht einfach probiert werden dürfen, eben weil giftige Stoffe darin enthalten sein können. Ältere Kinder sollte man dann genauer über einzelne Pflanzen und die mit ihnen verbundenen Gefährdungen unterrichten.

Es liegt auf der Hand, dass die Methode der Erziehung das Problem gründlicher angeht. Selbst wenn es möglich wäre, gifthaltige Pflanzen aus den öffentlichen Anlagen, in denen Kinder spielen, gänzlich zu entfernen, so fänden sich doch immer noch sogenannte Giftpflanzen in privaten Gärten, deren Bewuchs an öffentliche Wege oder Plätze heranreicht, oder in der natürlichen Landschaft rund um Dörfer und Städte. Der Umgang mit der Natur muss also in jedem Fall gelernt werden.

Unbestritten ist es sinnvoll, Kinderspielplätze von den giftigen Vertretern der sogenannten Giftpflanzen freizuhalten. Deshalb haben einige Länderministerien versucht, durch bestimmte Erlasse bzw. Bekanntmachungen über Anpflanzungen im Bereich von Kinderspielplätzen (in Baden-Württemberg auch Kindertagesstätten und Kinderheimen) gefährdende Pflanzen aus diesem kindlichen Umfeld auszuschließen, d. h. auch bereits gepflanzte „giftige“ Sträucher und Bäume

im Umfeld von öffentlichen Spielplätzen zu entfernen. Gegen ein solches rigores Entfernen aller „Giftpflanzen“ haben sich insbesondere die Ständige Konferenz der Gartenbauamtsleiter beim Deutschen Städtetag sowie der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau gewandt, da mit diesem Vorgehen pädagogische und ökologische Ziele außer Acht gelassen würden. Außerdem hätten viele der in den Erlassen bzw. Bekanntmachungen genannten Pflanzen gar keine oder kaum eine Bedeutung für die Beratungspraxis, wie aus den Statistiken der Giftinformationszentralen hervorgehe. Die Konferenz der Gartenbauamtsleiter sowie der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau plädieren deshalb dafür, nur vier wegen ihrer Früchte besonders auffallende Gehölzarten – den Goldregen, das Pfaffenhütchen, die Stechpalme und den Seidelbast – nicht an Spielplätzen anzupflanzen, jedoch grundsätzlich in geeigneter Weise auf giftige Bestandteile in Pflanzen hinzuweisen. Nach ihrer Meinung sollten die bestehenden Ländererlasse wieder aufgehoben werden, da sie in der Praxis, insbesondere bei den Verantwortlichen für Kindergärten, nur Verwirrung und Ängste ausgelöst hätten und ökologisch nicht verantwortbar seien.

## Warum war eine Überarbeitung der vorliegenden Broschüre nötig?

*(Vom Abdruck des Abschnitts wurde abgesehen.)*

## Was müssen sie im Vergiftungsfall tun?

Hat ein Kind doch einmal Pflanzenteile in den Mund genommen oder geschluckt, befolgen Sie bitte folgende Ratschläge:

- Wenn Sie nicht sicher sind, dass es sich um eine völlig ungiftige und unschädliche Pflanze handelt, rufen sie **sofort** in einer Giftinformationszentrale (GIZ) an. Eine nach Städten alphabetisch geordnete Liste der bundesdeutschen GIZ finden Sie am Schluss dieser Broschüre. Die GIZ, die besondere Erfahrungen hinsichtlich kindlicher Vergiftungsunfälle haben, sind mit einem K gekennzeichnet.

Schildern Sie möglichst genau die Symptome des Kindes und was Sie als Ursache erkannt haben oder vermuten. Diese Fibel kann Ihnen helfen, die Pflanze zu benennen. Wichtig ist außerdem anzugeben, welche Menge vermutlich aufgenommen wurde und wie lange das zurückliegt. Notieren Sie die Auskünfte der GIZ für Ihren Arzt.

- Sollten Vergiftungserscheinungen auftreten oder zu erwarten sein, gehören Kinder in ärztliche Behandlung. Befolgen Sie diesbezüglich genau die Empfehlungen der GIZ und suchen Sie gegebenenfalls ohne Verzögerung Ihren Kinderarzt oder die nächstgelegene Kinderklinik auf. Geben Sie die Information der GIZ an den behandelnden Arzt weiter. Bringen Sie ihm, wenn möglich, die verdächtige Giftpflanze oder Teile davon mit. Auch Apotheker und Gärtner können bei der Identifizierung von Giftpflanzen hilfreich sein.
- Vermeiden Sie **vorschnelle**, evtl. nicht notwendige oder sogar gefährliche Hilfsmaßnahmen. Bedenken Sie, dass die Mehrzahl der Fälle, bei denen Kinder Pflanzenteile zu sich nehmen, harmlos sind und keiner Behandlung bedürfen.
- Leisten Sie **Erste Hilfe nur im Notfall**, wenn ärztliche Hilfe nicht schnell genug zu bekommen ist.

## 22.10 Giftpflanzen

Manche Kinder erbrechen nach Aufnahme von Pflanzenteilen allein. Falls dies nicht der Fall ist, der schädliche Stoff aber entfernt werden muss, können Sie wie folgt vorgehen:

1. Lassen Sie das Kind ein oder zwei Gläser lauwarmen Himbeersaft oder lauwarmes Wasser trinken.
2. Legen sie sich das Kind in Bauchlage über Ihre Oberschenkel, den Kopf etwas nach unten hängend, damit das Erbrochene abfließen kann und nicht in die Luftröhre gerät.
3. Stecken sie den Finger tief in den Hals und drücken sie kräftig auf den Zungengrund.

So sollten Sie **nicht** vorgehen:

1. Geben Sie zum Auslösen von Erbrechen **niemals Salzwasser**: Das kann für kleine Kinder **lebensgefährlich** sein.
2. Geben sie zum Auslösen von Erbrechen **niemals Milch**, denn die Aufnahme fettlöslicher Gifte wird durch Milch gefördert.

## Bäume und Sträucher

### Goldregen

(*Laburnum anagyroides*)

**giftig:**

alle Teile, vor allem die Samen

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Etwa  $1/2$ -1 Stunde nach dem Verzehr kann es zu Erbrechen, Übelkeit, Leibschmerzen, Schwitzen, Blässe und Speichelfluss kommen, in schweren Fällen auch zu Bewusstlosigkeit, Krampfanfällen und Kreislaufversagen.

### Eberesche (Vogelbeerbaum)

(*Sorbus aucuparia*)

**schwach giftig:**

nur die frischen Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nur nach dem Verzehr größerer Mengen kann es zu Erbrechen und Durchfall kommen.

### Mahonie

(*Mahonia aquifolium*)

**giftig:**

die Wurzel und die Stammrinde

**schwach giftig:**

die blauen Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Allenfalls nach dem Verzehr größerer Mengen Früchte (mehr als 50) kann es zu Erbrechen und Durchfall kommen. Durch die Aufnahme größerer Mengen Rinde und Wurzelstöcke können Benommenheit und Nierenreizung auftreten.

## Zwergmispel

(*Cotoneaster*-Arten)

schwach giftig:

alle Teile einschließlich der roten Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Allenfalls nach dem Verzehr größerer Mengen kann es zu Erbrechen kommen.

## Feuerdorn

(*Pyracantha coccinea*)

schwach giftig bis ungiftig:

die roten, gelben oder orangefarbenen Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Allenfalls nach dem Verzehr größerer Mengen Früchte kann es zu Erbrechen und Durchfall kommen.

## Eibe

(*Taxus baccata*)

giftig:

Nadeln, zerbissene Samen

**ungiftig:** roter Samenmantel (süß schmeckend)

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Wenn die Samen beim Verzehr von „Beeren“ nicht zerkaut werden, sind keine Vergiftungen zu befürchten. Nach dem Herunterschlucken von Nadeln bzw. zerkauten Samen kann es schon nach etwa einer Stunde zu Übelkeit, Erbrechen und Leibschmerzen kommen, später auch zu Durchfall, weiten Pupillen und auffallend roten Lippen, in schweren Fällen auch zu Bewusstlosigkeit und Herzrasen; Todesfolge möglich.

## Rote und Schwarze Heckenkirsche

(*Lonicera xylosteum*, *Lonicera nigra*)

schwach giftig:

die roten, gelben oder orangefarbenen Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr größerer Beerenmengen (ca. 10) kann es zu Leibschmerzen, Erbrechen und Durchfall kommen.

## Seidelbast

(*Daphne mezereum*)

stark giftig:

alle Teile einschließlich der Samen der roten Beeren

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Der Umgang mit Pflanzenteilen kann an der Haut Rötung, Blasen und Pusteln hervorrufen. Nach dem Verzehr schon kleiner Mengen kann es in wenigen Minuten zu Kratzen und Brennen im Mund, dann zu Lippen- und Gesichtsschwellungen, Schluckbeschwerden, starken Kopf- und Leibschmerzen, Brechreiz, bluti-

## 22.10 Giftpflanzen

gem Durchfall, bei Kindern auch zu Verwirrtheit kommen. Der Verzehr von Beeren läuft glimpflich ab, wenn die Samen nicht zerkaut werden.

### Schneebeere (Knallerbse)

(*Symphoricarpos albus*, *S. rivularis*)

schwach giftig bis ungiftig:

die weißen Beeren

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr von 3 bis 4 Beeren entstehen im Allgemeinen keine Beschwerden. Bei Verzehr größerer Mengen kann es zu Leibschmerzen und Erbrechen kommen.

### Gemeiner Liguster

(*Ligustrum vulgare*)

giftig:

die schwarzen Beeren

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr kann es zu Erbrechen, Durchfall und Leibschmerzen kommen.

### Lorbeerkirsche

(*Prunus laurocerasus*)

giftig:

alle Teile, insbesondere Samen und Blätter, weniger das Fruchtfleisch der zunächst roten, später schwarzen Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Wenn Kinder beim Verzehr von Früchten die Samen ausspucken oder unzerkaut herunterschlucken, sind Erbrechen und Bauchschmerzen zu erwarten. Die zerkauten Samen können Kratzen im Hals, Erregung, verstärkte Atmung hervorrufen.

### Stechpalme

(*Ilex aquifolium*)

giftig:

die roten Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Essen mehrerer Beeren können Erbrechen, Leibschmerzen und Durchfall auftreten.

### Pfaffenhütchen

(*Euonymus europaeus*)

giftig:

alle Teile, vor allem die roten Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

3–24 Stunden nach der Aufnahme von Pflanzenteilen können Erbrechen, Leibscherzen und starker Durchfall auftreten, auch Kreislaufstörungen sind möglich.

**Gemeiner und Wolliger Schneeball**

(*Viburnum opulus*, *Viburnum lantana*)

**schwach giftig:**

Rinde, Blätter, die roten (Gemeiner Schneeball) bzw. schwarzen (Wolliger Schneeball) Beeren

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr von Pflanzenteilen kann es zu Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen kommen.

**Roskastanie**

(*Aesculus hippocstanum*)

**schwach giftig:**

Kastanien, besonders die grünen, unreifen Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr kann es zu Erbrechen und/oder Durchfall kommen.

**Lebensbaum**

(*Thuja occidentalis*, *Thuja orientalis*)

**giftig:**

alle Teile, besonders die Zweigspitzen und Zapfen

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Das Öl des Lebensbaumes kann Hautentzündungen verursachen. Nach dem Verzehr von Pflanzenteilen können Erbrechen, Durchfall und Leibscherzen auftreten, in schweren Fällen auch Krampfanfälle und Nierenschäden.

**Sadebaum (Sevenstrauch)**

(*Juniperus sabina*)

**giftig:**

alle Teile, am stärksten die jungen Triebe

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Das Sadebaumöl kann Blasen und auch tiefer gehende Schäden auf der Haut verursachen. Nach dem Verzehr von Pflanzenteilen können Erbrechen und Durchfall auftreten, in schweren Fällen auch Nierenschäden, Krampfanfälle und Lähmungen.

**Wunderbaum**

(*Ricinus communis*)

**stark giftig:**

Samen

## 22.10 Giftpflanzen

### mögliche Vergiftungserscheinungen:

Nach dem Verzehr können Erbrechen, Leibschmerzen und Durchfall auftreten, in schweren Fällen auch Nierenentzündung, Nierenversagen, Kreislaufstörungen; Todesfolge möglich.

### **Oleander**

(*Nerium oleander*)

#### giftig:

alle Teile

### mögliche Vergiftungserscheinungen:

Bei Verzehr von Pflanzenteilen kann es zu Erbrechen kommen, in schweren Fällen auch zu kolikartigen Leibschmerzen und Herzrhythmusstörungen.

### **Gemeiner Efeu**

(*Hedera helix*)

#### giftig:

Blätter, besonders die schwarzen Beeren

### mögliche Vergiftungserscheinungen:

Häufiges Anfassen von Efeublättern oder -wurzeln kann zu Hautentzündungen führen.

Nach dem Essen von Beeren kann es zu Brennen im Rachen, Erbrechen und/oder Durchfall kommen.

### **Robinie (Falsche Akazie)**

(*Robinia pseudoacacia*)

#### giftig:

Rinde, Samen

### mögliche Vergiftungserscheinungen:

Nach dem Verzehr können Leibschmerzen, Erbrechen und/oder Durchfall auftreten.

### **Faulbaum**

(*Rhamnus frangula*)

#### giftig:

Rinde, die zuerst roten, dann schwarzen Beeren

### mögliche Vergiftungserscheinungen:

Nach dem Verzehr kann es zu Erbrechen, Übelkeit und/oder Durchfall kommen, bei der Aufnahme größerer Mengen auch zu kolikartigen Leibschmerzen, drastischem Durchfall und Krampfanfällen.

### **Besenginster**

(*Cytisus scoparius*)

#### giftig:

Blätter und Samen

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr kann es zu Erbrechen und Leibschmerzen kommen, bei Aufnahme größerer Mengen auch zu Kreislaufstörungen.

**Krautige Pflanzen**

**Maiglöckchen**

(*Convallaria majalis*)

**giftig:**

alle Teile einschließlich der roten Beeren

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr können Erbrechen und Durchfall auftreten. Da die herzwirksamen Wirkstoffe schlecht aus dem Darm aufgenommen werden, kommt es nur selten zu Herzrhythmusstörungen.

**Garten- und Feuerbohne**

(*Phaseolus vulgaris*, *Phaseolus coccineus*)

**giftig:**

rohe Bohnen

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

2-3 Stunden nach dem Verzehr kann es zu manchmal schwer stillbarem, blutigem Erbrechen, Bauchschmerzen, blutigem Durchfall, Herzrasen, Kreislaufkollaps und Krampfanfällen kommen (Beobachtungen nach sehr unterschiedlichen Mengen roher Bohnen oder Bohnensamen).

**Tollkirsche**

(*Atropa belladonna*)

**stark giftig:**

alle Teile, besonders Wurzeln und Samen

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr kann es zu Trockenheit der Schleimhäute, Rötung des Gesichts, starkem Durst, beschleunigtem Puls und weiten Pupillen kommen, in schweren Fällen auch zu Gleichgewichtsstörungen, Übererregbarkeit, Sehstörungen, Krampfanfällen; Todesfolge möglich.

**Bittersüßer Nachtschatten**

(*Solanum dulcamara*)

**giftig:**

alle Teile einschließlich der noch grünen, unreifen Beeren; reife rote Beeren enthalten nur noch Spuren giftiger Stoffe

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr größerer Mengen kann es sofort oder erst nach Stunden zu Kratzen im Hals, Erbrechen, Leibschmerzen kommen, in schweren Fällen auch zu Sinnestäuschung, Ruhelosigkeit und Krampfanfällen.

## 22.10 Giftpflanzen

### Schwarzer Nachtschatten

(*Solanum nigrum*)

**giftig:**

alle Teile einschließlich der noch grünen, unreifen Beeren; schwarze reife Beeren enthalten nur noch Spuren oder gar keine giftigen Stoffe

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

wie Bittersüßer Nachtschatten (s. o.)

### Kartoffel

(*Solanum tuberosum*)

**giftig:**

alle oberirdischen Teile einschließlich der grünen Beeren, außerdem die Kartoffelkeime; die Kartoffelknolle nur dann, wenn sie bei zu viel Licht gelagert wurde (Grünfärbung)

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr kann es ähnlich wie bei den anderen Nachtschattengewächsen zu Halsschmerzen, Erbrechen, Leibschmerzen und Durchfall kommen, in schweren Fällen auch zu optischen Täuschungen, Angst und Krampfanfällen.

### Gefleckter Aronstab

(*Arum maculatum*)

**giftig:**

alle frischen Pflanzenteile einschließlich der roten Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr kann es zu Brennen und Prickeln im Mund, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall kommen, in schweren Fällen auch zu Erregung, Schwindel sowie Krämpfen in den Extremitäten. In den letzten Jahren wurden keine Fälle mit tödlichem Ausgang mehr bekannt.

### Stechapfel

(*Datura stramonium*)

**stark giftig:**

alle Teile, besonders Wurzeln und Samen

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

wie bei der Tollkirsche<sup>(Fn.1)</sup>. Rötung des Gesichts und beschleunigter Puls können fehlen, Halluzinationen in den Vordergrund treten.

### Schwarzes Bilsenkraut

(*Hyoscyamus niger*)

**stark giftig:**

alle Teile, besonders die Samen

1. Anmerkung der Redaktion: Siehe S. 9.

mögliche Vergiftungserscheinungen:  
wie bei der Tollkirsche<sup>(Fn.1)</sup>

### **Wasserschierling**

(*Cicuta verosa*)

**stark giftig:**

alle frischen Pflanzenteile, vor allem die an Sellerie erinnernden Wurzeln

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Kauen schon kleiner Wurzelstückchen kann es nach einer halben bis einer Stunde zu heftigem Brennen im Mund und Erbrechen kommen, in schweren Fällen auch zu Krampfanfällen; Todesfolge möglich.

### **Gefleckter Schierling**

(*Conium maculatum*)

**stark giftig:**

alle Teile, besonders die Früchte

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr kann es zu heftigem Erbrechen, Herzrasen, weiten Pupillen kommen, in schweren Fällen auch zu Lähmungen, die von den Beinen her aufsteigen; Todesfolge möglich.

### **Virginischer Tabak**

(*Nicotiana tabacum*)

**giftig:**

alle Teile, frisch und als Tabak, auch die bisher als ungiftig angesehenen Samen

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Leichte Nikotinvergiftung nach dem Verzehr geringer Mengen können sich durch Erbrechen, Übelkeit, Durchfall, Schwindel, Kopfschmerzen, Händezittern äußern; schwere Vergiftungen sind gekennzeichnet durch Blässe, kalten Schweiß, Herzrasen, Krampfanfälle, Bewusstseinsverlust; Todesfolge durch Atemlähmung möglich.

### **Roter Fingerhut**

(*Arum maculatum*)

**giftig:**

alle Teile

**mögliche Vergiftungserscheinungen:**

Nach dem Verzehr kann es zu Übelkeit, Erbrechen und Leibschmerzen kommen. Wenn nicht erbrochen wird, sind auch Herzrhythmusstörungen, Sehstörungen und Halluzinationen möglich.

1. Anmerkung der Redaktion: Siehe S. 9.

## 22.10 Giftpflanzen

### Blauer und Gelber Eisenhut

(*Aconitum napellus*, *Aconitum vulparia*)

stark giftig:

alle Teile, besonders die Wurzeln und Samen

mögliche Vergiftungserscheinungen:

Schon 10–20 Minuten nach dem Verzehr kann zu Brennen und Kribbeln im Munde und in den Fingern und Zehen kommen sowie zu völliger Empfindungslosigkeit der Haut mit Gefühl der Kälte, weiterhin zu heftigem Erbrechen und kolikartigen Durchfällen. In sehr schweren Fällen können auch starke Muskelschmerzen, Herzrhythmusstörungen und Lähmungen auftreten; Tod durch Atemlähmung oder Kreislaufversagen möglich.

### Herbstzeitlose

(*Colchicum autumnale*)

stark giftig:

alle Teile, besonders die Samen

mögliche Vergiftungserscheinungen:

2–6 Stunden nach dem Verzehr kann es zu Brennen im Mund, Schluckbeschwerden, Erbrechen und Durchfall kommen, in schweren Fällen auch zu Herzrasen, Krampfanfällen und aufsteigenden Lähmungen; Todesfolge durch Atemlähmung möglich.

### Rotbeerige und Schwarzbeerige Zaunrübe

(*Bryonia dioica*, *Bryonia alba*)

giftig:

alle Teile einschließlich der roten bzw. schwarzen Beeren

mögliche Vergiftungserscheinungen:

Bei Hautkontakt mit Pflanzensaft können Rötungen und Blasen entstehen.

Nach dem Verzehr kann es zu heftigen Leibschmerzen, Erbrechen und blutigem Durchfall kommen, in schweren Fällen auch zu Nierenschäden.

### Gelbe und Blaue Lupine

(*Lupinus luteus*, *Lupinus angustifolius*)

giftig:

die Samen

mögliche Vergiftungserscheinungen:

Nach dem Verzehr kann es zu Erbrechen, Leibschmerzen und Durchfall kommen, in schweren Fällen auch zu Herzrhythmusstörungen.

### Christrose

(*Helleborus niger*)

giftig:

alle Teile

mögliche Vergiftungserscheinungen:

Nach dem Verzehr kann es zu Kratzen in Mund und Rachen, erhöhtem Speichelfluss, Erbrechen, Leibschmerzen, Durchfall und weiten Pupillen kommen.

### **Riesen-Bärenklau (Herkulesstaude)**

(*Heracleum mantegazzianum*)

### **Wiesen-Bärenklau**

(*Heracleum sphondylium*)

giftig:

Stängelsaft

mögliche Vergiftungserscheinungen:

Vor allem beim Abschlagen der Stängel, wenn der austretende Saft auf die Haut tropft und die Sonne anschließend auf diese Stelle scheint, können Hautrötungen mit Blasen entstehen wie bei Verbrennungen 1. und 2. Grades.

### **Zypressen- und Garten-Wolfsmilch**

(*Euphorbia cyparissias*, *Euphorbia peplus*)

giftig:

alle Teile durch den Milchsafte

mögliche Vergiftungserscheinungen:

Auf der Haut kann der Milchsafte Blasen und Pusteln hervorrufen. Milchsafte-spritzer ins Auge verursachen manchmal Bindehaut- und Hornhautentzündungen.

Nach dem Verzehr können sich auch im Mund schmerzhaftel Blasen bilden, es kann zu Erbrechen, Leibschmerzen und Durchfall kommen, in schweren Fällen auch zu Kreislaufstörungen und Krampfanfällen.

### **Scharfer Hahnenfuß (Butterblume)**

(*Ranunculus acris*)

giftig:

alle Teile

mögliche Vergiftungserscheinungen:

Bei Hautkontakt ist Blasenbildung möglich.

Nach dem Verzehr kann es zu Erbrechen, Übelkeit, Leibschmerzen und Durchfall kommen.

## **Topfpflanzen**

### **Dieffenbachie**

(*Dieffenbachia*)

giftig:

alle Teile durch den Pflanzensaft

## 22.10 Giftpflanzen

### mögliche Vergiftungserscheinungen:

Beim Verzehr frischer Pflanzenteile können innerhalb von 30 Minuten Rötung, Schwellung, starker Schmerzen im Mund sowie Schluckbeschwerden auftreten. Die schnell einsetzenden Beschwerden im Mund halten meist vom Verzehr größerer Mengen ab, andernfalls sind schwere Schäden der Magenschleimhaut zu erwarten.

Pflanzensaftspritzer ins Auge können schmerzhaft Entzündungen an Hornhaut und Bindehaut verursachen.

### **Korallenbäumchen**

(*Solanum pseudocapsicum*)

schwach giftig:

alle Teile einschließlich der korallenfarbigen Früchte

mögliche Vergiftungserscheinungen:

Nach dem Verzehr können Leibschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auftreten.

### **Weihnachtsstern**

(*Euphorbia pulcherrima*)

schwach giftig:

der Milchsaft

mögliche Vergiftungserscheinungen:

Nach dem Verzehr können Erbrechen und Durchfall auftreten.

### **Alpenveilchen**

(*Cyclamen persicum*)

giftig:

die Knolle

ungiftig:

Blüten, Blätter

mögliche Vergiftungserscheinungen:

Bereits kleine Stückchen der Knolle können Erbrechen und/oder Durchfall verursachen, in schweren Fällen auch Krampfanfälle und Lähmungen.

### **Einige ungiftige Ziersträucher**

zur kinderfreundlichen Bepflanzung von Gärten und Anlagen geeignet

Apfelrose, Japanische

Blut-Johannisbeere

Deutzie, Hohe

Fächer-Ahorn, Roter

Felsenbirne, Kanadische

Fingerstrauch

Flieder

Forsythie

Kolkwitzie

Kornelkirsche

Pfeifenstrauch (Falscher Jasmin)

Purpur-Hartriegel

*Rosa ri...osa*

*Ribes sa...guineum*

*Deutuo...a scabra*

*Acer palmatum*

*Amelanchier canadensis*

*Potentilla fruticosa*

*Syringa vulgaris*

*Forsythia intermedia*

*Kolkwitzia amabilis*

*Cornus mas*

*Philadelphus coronarius*

*Cornus alba*

Ranunkelstrauch  
 Rosen-Eibisch  
 Scheinquitte, Japanische  
 Schmetterlingsstrauch  
 Silber-Eschenahorn  
 Spierstrauch  
 Tamariske  
 Zierkirsche, Japanische

*Kerria japonica*  
*Hibiscus syriacus*  
*Chaenomeles-Hybriden*  
*Buddlei davidil*  
*Acer negundo*  
*Spiraea bumalda*  
*Tamarix parviflora*  
*Prunus serrulata*

### **Verzeichnis der Gifteinformationszentren der Bundesrepublik Deutschland (gemeldet nach § 16 e ChemG; Stand: November 2005)**

**Berlin:** Giftberatung Virchow-Klinikum,  
 Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin, Tel.: 030 45065-3555, Fax: 030 45055-3915

**Berlin:** Institut für Toxikologie, Haus 17  
 Oranienburger Str. 285, 13437 Berlin,  
 Tel.: 030 19240, Fax: 030 30686721, Internet: [www.Giftnotruf.de](http://www.Giftnotruf.de)

**Bonn:** Informationszentrale gegen Vergiftungen,  
 Zentrum für Kinderheilkunde der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität  
 Bonn,  
 Adenauer Allee 119, 53113 Bonn, Tel.: 0228 19240, Fax: 0228 2873314

**Erfurt:** Gemeinsames Gifteinformationszentrum der Länder  
 Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen,  
 Nordhäuser Straße 74, 99089 Erfurt, Tel.: 0361 730730, Fax: 0361 7307317

**Freiburg:** Universitätskinderklinik Freiburg, Informationszentrale für Vergif-  
 tungen,  
 Mathildenstraße 1, 79106 Freiburg, Tel.: 0761 19240, Fax: 0761 2704457

**Göttingen:** Gifteinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg,  
 Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord),  
 Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universität Göttingen,  
 Robert-Koch-Straße 40, 37099 Göttingen, Tel.: 0551 19240 für die Bevölkerung  
 (für med. Fachpersonal 0551 383180), Fax: 0551 3831881

**Homburg:** Informations- und Beratungszentrum für Vergiftungsfälle,  
 Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Gebäude 9, 66421 Homburg/Saar,  
 Tel.: 06841 19240 oder 06841 1628315, Fax: 06841 1628438

**Mainz:** Klinische Toxikologie und Beratungsstelle bei Vergiftungen der Länder  
 Rheinland-Pfalz und Hessen, Universitätsklinikum,  
 Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel.: 06131 19240, 06131 232466, Fax: 06131  
 232469

**München:** Giftnotruf München, Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik  
 und Poliklinik, rechts der Isar der Technischen Universität München,  
 Ismaninger Straße 22, 81675 München, Tel.: 089 19240

**Nürnberg:** Medizinische Klinik 2, Klinikum Nürnberg,  
 Lehrstuhl Innere Medizin FAU Erlangen-Nürnberg  
 Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg, Tel.: 0911 3982451, Fax: 0911 3982192

## **22.10 Giftpflanzen**

### **Weitere Informationsstellen**

**Leipzig:** Institut für Klinische Pharmakologie der Universität,  
Härtelstraße 16-18, 04107 Leipzig,  
Tel.: 0341 9724666 oder 0171 5068019, Fax: 0341 9724659

**Kassel:** Toxikologischer Notdienst,  
Druseltalstraße 61, 34117 Kassel, Tel.: 0561 9188120, Fax: 0561 9188199

**Papenburg/Ems:** Pädiatrische Abteilung Marienhospital,  
Hauptkanal rechts 75, 26871 Papenburg/Ems, Tel.: 04961 93-1381  
(Zentrale 04961 93-0), Fax: 04961 93-1389